

Petite sélection de photos retrouvées

Jean-Luc Muller - Fabien Sarraillon

Ordre : Entolomatales - Famille : Entolomataceae

Entoloma araneosum (Quélet) Moser

Synonymes : *Entoloma fulvostrigosum*, *Entoloma araneosum* fo. *fulvostrigosum*

Nom français : Entolome aranéeux - Nom allemand : Spinnwebiger Rötling



Nous avons trouvé cette espèce saprotrophe début septembre en forêt de chênes/charmes/hêtres. Il est très proche d'*E. versatile* dont il est une réplique grise. Avec un chapeau ornementé de soies constituant un tomentum aranéeux, cette rare espèce présente un habitus mycénoïde qui peut désorienter. Son odeur est herbacée avec une légère composante farinolente. Sa saveur est désagréable. Cependant, ses

caractères microscopiques, notamment des cheilocystides à col long et l'absence de pleurocystides, facilitent son identification.

Ordre : Telephorales - Famille : Telephoraceae

Telephora atroctrina Quélet

Nom français : pas défini - Nom allemand : Schwarzzgelber Erdwarzenpilz

Donnée rare dans certaines régions, plus commune dans d'autres, cette espèce à basidiome spatulé à flabelliforme, ici représentée jeune (extrémité des frondes citrin pâle) a été trouvée sous hêtres dans un petit parterre de graminées. Ses lobes, noirâtre à la base sont larges, épais, mous et prennent une couleur plus terne vers le blanc sur le tard aux extrémités

Mature, sa surface piléique est presque lisse alors qu'elle se trouve tomenteuse à fibrilleuse



au départ. L'hyménium est gris noirâtre très légèrement violeté. *T. citrina* a un mode de vie saprotrophe puis ectomycorhizien.

Ordre : Clavariales - Famille : Clavariaceae (Otto : Fr.) Fr.

Clavulinopsis daigremontania (Boudier) Corner

Synonymes : *Clavaria daigremontiana* Boud.



On trouve souvent un petit *Clavulinopsis* filiforme jaune dans les prés. Lorsqu'on le met au microscope, on découvre des spores avec de très grosses verrues typiques de *Clavulinopsis helvola*. Son cousin *Clavulinopsis fusiformis* lui ressemble beaucoup mais pousse en fascicule et a des spores lisses et subglobuleuses. Quant à *Clavulinopsis daigremontiana*, il est légèrement plus petit, d'un beau jaune ochracé, et avec

des spores ovoïdes.

C'est cette dernière qui a été trouvée pour la première fois cette année à la Gauchmatt. On doit encore citer parmi les *Clavulinopsis* jaunes, *C. corniculata* qui, comme son nom l'indique, a des fructifications ramifiées et une nette odeur de farine.

Ordre : Tricholomatales - Famille : Dermolomataceae (Otto : Fr.) Fr.

Camarophyllopsis foetens (Phillips) Arnolds

Synonymes : *Aeruginospora foetens* (Phillips) Moser - *Camarophyllus foetens* (Phillips) J.E. Lange ...

Nom français : Camarophyllopsis fétide - Nom allemand : Stinkender Samtellerling

Voici un champignon bien particulier, on sait tous que les odeurs sont des éléments importants pour la détermination d'une espèce, mais là ! Ce champignon doit être classé parmi les premiers de la classe pour son odeur typique, très forte, comparable à celle de la naphthaline. Quelques champignons dans une pièce signalent sa présence. Sa forme très proche des *Hygrocybe* à lames décourbées et sa couleur gris brun orientent la détermination.



Ordre :Tricholomatales - Famille : Lyophyllaceae

Gerhardtia borealis (Fr.) Contu et Ortega 2002

Synonymes : *Gerhardtia incarnatobrunneum* (Gerhardt) Bon ...

Nom français : Tricholome brun-rose



Ce champignon, aux couleurs de *Collybia distorta* ou de *Rhodocybe truncatus*, c'est tout une histoire ; La première trouvaille remonte en 1992 à Wingen sur Moder lors des rencontres SMS où il avait été appelé « Tricholome de Wingen ou cf. *Tricholoma boreale* (in Cetto). Par la suite ce champignon a été traité de tous les noms : *Tricholoma*, *Calocybe*, *Lyophyllum*,

Gyrophila, *Rhodocybe*, *Gerhardtia* et de tous les prénoms : *civilis*, *borealis*, *serius*, *incarnatobrunneum*, *calocyboïdes*. A ce jour il a été retrouvé à Michelbach, Lautenbach, Petit-Ballon, Ungersheim (Eco-Musée), Hardt, Osenbach et dans le Massif Central par un membre de la SMHR. Espèce intéressante, difficile à déterminer quand on ne l'a jamais vue. Odeur et goût farineux sont déterminants.

Ordre :Tricholomatales - Famille : Lyophyllaceae

Rugosomyces obscurissimus (A. Pearson) Bon

Synonymes : *Calocybe obscurissima* (A. Pearson) Moser ...

Nom français : Tricholome brun-rose

Ces champignons, de taille modeste, poussent dans les prés et dans les bois. Ils se singularisent par leurs teintes ternes et sombres, leur odeur farineuse et leurs petites spores (6-7 x 3-4 µm).

D'autres taxons du genre *Rugosomyces* sont vivement colorés : rosâtre carné pour *C. carneus* et *C. persicolor*, jaune d'or pour *C. chrysenteron* et violacé pour *C. ionides*. Notre espèce fait un peu exception parmi



ces couleurs chatoyantes. En effet, *R. obscurissimus* est à la fois terne et sombre. Mais c'est ce caractère même qui fait de lui un champignon à part dans son genre.

Ordre : Cantharellales - Famille : Cantharellaceae

Craterellus konradii (A. Pearson) Bon

Nom français : Trompette-des-morts jaune - Nom allemand : Gelbe Totentrompete



Peut-être issu d'une simple variabilité chromatique de *Craterellus cornucopioïdes*, ce champignon reste néanmoins très rare. En effet, ces spécimens, considérés par certains comme des formes jaunes de la Trompette-des-morts (= *Craterellus cornucopioïdes* fo. *lutea*) ne se montrent pas tous les ans en Alsace.

Associés à des feuillus divers, ces champignons symbiotiques jaunes doivent peut-être leur couleur à la composition des nutriments recherchés par les hyphes du mycélium. Ces stations vulnérables sont donc à préserver. Cette espèce a été

classée en catégorie VU dans la Liste Rouge des espèces menacées (8 sept. 2014).

Ordre : Entolomatales - Famille : Entolomataceae

Entoloma niphoides (Romagnesi) ex Noordeloos

Synonymes : *Rhodophyllus clypeatus* var. *niveus* Quélet ...

Nom français : Entolome blanc de neige – Nom allemand : Elfenbeinweißer Frühlingsrötling

Encore une espèce qui, pour de nombreux mycologues, pourrait être simplement une forme blanche d'*Entoloma clypeatum*.

En effet les spécimens représentés se trouvaient à quelques centimètres de toute une colonie d'*Entoloma clypeatum* type.

A remarquer un synonyme d'*E. niphoides*, *Rhodophyllus clypeatus* var. *niveus* décrit par Quélet. Ce dernier, a-t-il, en son temps, déjà remarqué une proximité entre ces sporophores blancs et *E. clypeatum* ?

Peut-être qu'un séquençage des ITS de ces individus de couleurs différentes nous donnera plus d'indications dans les années à venir.

La forme *pallidogriseum* d' *E. clypeatum* n'est peut-être qu'un intermédiaire entre le type et la fo. *albinique*.



Ordre : Cantharellales - Famille : Cantharellaceae

Craterellus ianthinoxanthus (Maire) Pérez-De-Gregorio

Synonymes : *Cantharellus ianthinoxanthus* (Maire) Kühner

Nom français : Chanterelle violette et jaune – Nom allemand : Gelbvioletter Pfifferling



Dans le guide d'Eyssartier/Roux *C. ianthinoxanthus* est indiquée comme plus rare que *C. melanoxeros*, ce qui n'est pas vraiment le cas chez nous en Alsace. Ces deux espèces ne sont pas toujours faciles à séparer mais il est possible de trouver quelques caractères macroscopiques les distinguant. En plus de l'habitus, plutôt charnu pour *C. ianthinoxanthus* alors qu'il est de type « tubaeformis » pour *C. melanoxeros*. La couleur de l'hyménophore et les plis permettent éventuellement de les distin-

guer sur le terrain.

Ordre : Cantharellales - Famille : Cantharellaceae

Craterellus melanoxeros (Desmazières : Fr.) Pérez-de-Gregorio

Synonymes : *Cantharellus melanoxeros* Desmazières

Nom français : Chanterelle noircissante – Nom allemand : Schwärzender Pfifferling

Moins commune dans notre Haut-Rhin que *C. ianthinoxanthus*, cette craterelle se distingue par le noircissement de sa chair.

Nous avons trouvé souvent *C. ianthinoxanthus* avec des chapeaux jaune abricot alors que chez *C. melanoxeros* les teintes sont plus ternes, jaune grisâtre.

L'hyménium gris violacé chez *C. melanoxeros* tire plutôt vers le rosâtre chez *C. ianthinoxanthus*. Quant aux plis, caractère distinctif déjà cité ci-dessus, ils

sont irréguliers, tortueux chez *C. ianthinoxanthus* alors qu'ils sont plutôt bien formés, avec quelques fourches et anastomoses chez *C. melanoxeros*. Tout cela n'est, bien sûr, pas toujours facile à observer. De futures analyses génétiques apporteront peut-être des précisions quant à la séparation de ces deux taxons.



REMERCIEMENTS : à Paul Hertzog pour la relecture de cet article, ses déterminations et ses précieux conseils.