

Rencontre avec *Boletus pulverulentus* var. *sublateritius*

Fabien Sarraillon

Boletus pulverulentus Opat. est l'un des plus petits bolets que nous rencontrons dans nos forêts. Sa forme évoque plutôt un *Xerocomus* et il a un beau chapeau marron. Sa variété *sublateritius* est quant à elle beaucoup plus rare. C'est lors d'une sortie SMHR dans la forêt de Kruth le 25/08/2012 que nous avons eu la chance de trouver une dizaine d'exemplaires. Les champignons poussaient dans un creux de vallée humide dans un bois mêlé de feuillus et conifères.

En arrivant sur le champignon, qui poussait dans la mousse et était à moitié caché, on a immédiatement remarqué un beau chapeau rose rougeâtre rappelant *Xerocomus rubellus* Quélet. Mais, dès la cueillette, le bleuissement immédiat et intense ne laisse pas de doute, nous avons affaire à *B. pulverulentus*.

Sa couleur cependant déconcerte un peu au point que durant un instant on a pensé à *Aureoboletus gentilis* (Quelet) Pouzar.



En effet, son chapeau est aussi d'un beau rosâtre incarnat, normalement très visqueux, mais étant donné que la récolte avait été faite après une période de forte chaleur et sécheresse, la surface du chapeau aurait pu sécher. Avec des pores jaune vif et un stipe jaune devenant roussâtre vers la base. Mais le bleuissement finalement écarte complètement cette espèce.

Cette belle couleur du chapeau nous faisant toujours hésiter, le bleuissement intense nous fait alors penser à *Gyrodon lividus* (Bull.:Fr.) Sacc. Cette espèce qui a en effet un très fort bleuissement et qui est habituelle des zones humides et calcaires de la plaine serait-elle venue en vacances dans le fond de la vallée de Thann ? Mais non, ni la couleur du chapeau, ni la décurrence des lames ne « collent ».

C'est finalement Paul Hertzog, lorsqu'on lui a présenté le champignon sous le nom de *Boletus pulverulentus* qui a précisé, «



mais vous savez qu'il existe une variété *sublateritius* ? » Bien sûr, après avoir consulté plusieurs ouvrages mycologiques, c'est finalement dans le DM hors série consacré aux Boletaceae qu'on a retrouvé notre champignon.

En définitive, ce 25/08/2012 aura été une belle journée. En premier lieu car c'était l'occasion d'une sortie SMHR bien sûr mais aussi parce que les participants étaient venus sans grands espoirs étant

donnée la sécheresse. Au final, nos guides nous ont amenés dans des forêts magnifiques avec beaucoup de belles espèces, donc *B. pulverulentus* var. *sublateritius* qui est facile à reconnaître, une fois qu'on la connaît.



Boletus pulverulentus* var. *sublateritius Guinberteau, Lannoy et Estades ad int.

Chapeau de 40 à 80mm de diamètre, d'un beau rouge carmin pale, surface lisse, hémisphérique, finement velouté puis glabre avec l'âge, légèrement visqueux par temps humide. Pore d'un beau jaune vif. Pied 10-20 x 50-80mm avec une surface finement velouté jaune devenant rouge vers la base, le velours légèrement rouge donne une couleur typique. Chaire jaune se tachant immédiatement en bleu noir, l'ensemble du champignon se tache immédiatement à la manipulation. Spores 9-14 x 5-5µm.



Photos : J-L. Muller (*X. rubellus*)
F. Sarraillon (*A. gentilis* - *G. lividus* - *B. pulverulentus* - *B. pulverulentus* var. *sublateritius*)