

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

SOPPE-LE-HAUT

SAMEDI 22 JUIN 2024

**SORTIE ORGANISEE PAR LA SMHR
(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)**

**1ERE PARTIE :
FONGE ET OBSERVATIONS DIVERSES**

Guide : Francis BACH et Jean-Claude VANNIER

**Déterminateur des champignons observés dans la forêt :
Daniel DOLL - Daniel FISCHER**

**Déterminateurs des champignons présentés sur les tables à la fin de la sortie :
Daniel DOLL - Jean-Luc MULLER et participants**

Déterminateurs de Myxomycètes : Daniel DOLL et Bernard WOERLY

Déterminatrice des limaces : Aurore STOFFER

Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX



Amanita excelsa (Fr.) Bertill., 1866
Amanite élevée - Amanitales - Amanitaceae



Antrodia serialis (Fr.) Donk, 1966 - Polyporales - Meripilaceae



Auricularia auricula-judae (Bull.) Quéél., 1886
Oreille de Judas - Auriculariales - Auriculariaceae



Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers., 1822
Oreille poilue - Auriculariales - Auriculariaceae



***Dacrymyces stillatus* Nees, 1816 - Dacrymycetales - Dacrymycetaceae**

(Nota : le type peut être jaune, très proche de *deliquescens* var. *minor*, mais la spore colle mieux pour le type. Absence de boucles et basides en diapason « Daniel DOLL »)



***Piptoporus betulinus* (Bull.) P. Karst., 1881**
Polypore du bouleau - Polyporales - Fomitopsidaceae

Nota :

Le dessous de *Piptoporus betulinus* est parasité par :
***Hypocrea pulvinata* Fuckel, 1870 - Hypocreales - Hypocreaceae**



Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél., 1872
Pleurote pulmonaire - Tricholomatales - Pleurotaceae



***Pluteus phlebophorus* (Ditmar) P. Kumm., 1871**
Plutée veiné - Pluteales - Pluteaceae




***Scutellinia crinita* (Bull.) Lambotte, 1887 - Pezizales - Pyronemataceae**

(Nota : *Scutellinia crinita* confirmé, du moins en suivant Ascofrance, car avec la clé de Schumacher on va vers *pilatii*. Mais les spores sur le frais peuvent avoir, à les lire, 2-3µm de plus que sur le matériel sec « Daniel DOLL »)



Xylaria polymorpha (Pers.) Grev., 1824
Xylaire polymorphe - Doigt de Satan - Doigt du mort
Xylariales - Xylariaceae

MYXOMYCETES



Fuligo septica (L.) F.H. Wigg., 1780
Fleur de tan - Physarales - Physaraceae



***Fuligo septica* (L.) F.H. Wigg., 1780**
Fleur de tan - Physarales - Physaraceae



Fuligo septica var. *candida* (Pers.) R.E. Fr., 1912 - Physarales - Physaraceae



Lycogala conicum Pers., 1801 - Liceales - Reticulariaceae



***Stemonitis cf axifera* - Stemonitales - Stemonitidaceae**

Sans doute *Stemonitis axifera* (Bull.) T. Macbr., 1889
mais jamais 100% sûr si pas de vérification micro (Bernard WOERLY)



***Stemonitopsis cf typhina* - Stemonitales - Stemonitidaceae**

Nota :

Immature. Plasmode blanc, couleur rose donnée par les spores qui ont commencé leur développement. D'après la forme des sporocystes, courtement cylindriques, ce sera un *Stemonitopsis*, proche de *typhina* type ou de sa variété *similis* (Bernard WOERLY).



Stemonitopsis cf typhina - Stemonitales - Stemonitidaceae

OBSERVATIONS MALACOLOGIQUES



Arion rufus (Linnaeus, 1758)
Grande loche - Stylommatophora - Arionidae



Arion rufus (Linnaeus, 1758)

Grande loche - Stylommatophora - Arionidae

Limace mangeant :

Boletus reticulatus Schaeff., 1774

Synonyme : *Boletus aestivalis*(Paulet) Fries, 1838

Cèpe d'été - Boletales - Boletaceae



Limax cinereoniger Wolf, 1803
Grande limace - Stylommatophora - Limacidae



Limax cinereoniger Wolf, 1803
Grande limace - Stylommatophora - Limacidae



***Limax cinereoniger* Wolf, 1803**
Grande limace - Stylommatophora - Limacidae

Limace mangeant :

Russula nigricans Fr., 1838
Russule noircissante - Russulales - Russulaceae



***Limax cinereoniger* Wolf, 1803**
Grande limace - Stylommatophora - Limacidae

Limace mangeant :

Clathrus archeri (Berk.) Dring, 1980
Synonyme : *Anthurus archeri* (Berk.) E. Fisch., 1886
Anthurus étoilé - Anthurus d'Archer - Doigts du diable - Pieuvre des bois
Phallales - Phallaceae

OBSERVATION ENTOMOLOGIQUE



Collembole sur :

***Amanita excelsa* (Fr.) Bertill., 1866
Amanite élevée - Amanitales - Amanitaceae**