

TRICHOLOMOPSIS RUTILANS (Pilat - Singer)

Mme M. MAURER - Mars 1984

(Pleurotus Rutilans de certains auteurs)

Cette espèce fait partie du petit groupe des Tricholomes lignicoles (TRICHOLOMOPSIS - Pilat) qu'on a d'ailleurs parfois, pour cette raison, classé parmi les Pleurotes, mais aucun Pleurote n'en est voisin.

Il n'existe d'ailleurs que 3 espèces de Tricholomopsis en Europe. Tricholomopsis Rutilans est fréquent à la fin de l'été et en automne dans les bois de conifères, sur les souches et dans leur voisinage immédiat.

Chapeau 5-20 cm, charnu et épais lorsqu'il est encore hémisphérique et non étalé. Il est recouvert d'un beau velouté pourpre violet qui, de continu qu'il était, se disjoint au cours de la croissance, sauf au milieu, en une foule de petites houppes ou mèches rouge pourpre sur fond jaunâtre.

Pied trapu et épais 6-12 x 1-2 cm, ferme, cylindrique, parfois courbe, élastique, fibrileux, jaune panaché de mèches pourpres ou rougeâtres, sauf en haut, mais sans trace de cortine.

Chair épaisse, assez molle, teintée de jaune, sans odeur frappante, saveur douce.

Mamelles serrées, adnées, arrondies sur le pied, d'un jaune plus ou moins vif et à arête floconneuse.

Les couleurs de ce champignon sont assez variables.

Spores blanches ovoïdes, non amyloïdes.

Sans saveur comestible.

On a essayé de créer quelques variétés comme :

- var. Albofimbriatum ou var. Variegatum

espèce pâle et plus petite, à lames également pâles et à arête entière. En fait, il s'agit toujours du même champignon.

-----